siendo $A = (a_{ij})$ la matriz de coeficientes dada por el problema original. Esto es, se pide resolver la ecuación $(D - A \cdot)(X) = G$ donde A es la matriz ya indicada, $G = \begin{pmatrix} g_1(t) \\ \vdots \\ g_n(t) \end{pmatrix}$ y X es la incógnita, elemento de $M^{1 \times n}(\mathcal{A})$.

Nota. Si $X_0 \in M^{1 \times n}(\mathcal{A})$ es una solución particular, cualquier otra matriz X' es solución si y sólo si $(D - A \cdot)(X') = G = (D - A \cdot)(X_0)$, lo que ocurre sólo si $(D - A \cdot)(X' - X_0) = 0$. Esto es, conocida una solución cualquiera de la ecuación X_0 , el resto de las soluciones se obtienen sumando a ésta matrices X anuladas por $(D - A \cdot)$.

El problema queda entonces reducido a encontrar una **solución particular** X_0 y la solución de la **ecuación homogénea** $(D - A \cdot)(X) = 0$.

Por analogía con las ecuaciones diferenciales lineales con una sola incógnita, haremos uso de un elemento invertible de $M^{n \times n}(\mathcal{A})$ al que denotaremos por e^{At} cuya propiedad básica va a ser que $D(e^{At}) = A \cdot e^{At}$.

Para dicho elemento se cumple la siguiente **fórmula de conmutación**:

$$(D - A \cdot)(e^{At} \cdot Y) = D(e^{At} \cdot Y) - A \cdot e^{At} \cdot Y = e^{At} \cdot D(Y) + D(e^{At}) \cdot Y - A \cdot e^{At} \cdot Y = e^{At} \cdot D(Y)$$

Por lo que, tomando $Y = (e^{At})^{-1} \cdot X$, se deduce que un elemento $X = e^{At} \cdot (e^{At})^{-1} \cdot X$ pertenece al núcleo de $(D - A \cdot)$ si y sólo si $(e^{At})^{-1} \cdot X$ está en el núcleo de D .

Por otra parte el núcleo de D es fácil de calcular: para que $D(x_i(t)) = 0$ se cumpla, la condición necesaria y suficiente es que $x_i(t)$ sean constantes.

Así pues, X es solución del sistema de ecuaciones diferenciales lineales $(D - A \cdot)(X) = 0$ si y sólo si $(e^{At})^{-1} \cdot X$ es una matriz de funciones constantes C . Esto es, la solución general de dicha ecuación es $X = e^{At} \cdot C$ con $C \in M^{1 \times n}(\mathbb{C})$.

Se ha probado entonces la validez de la siguiente:

Proposición. La solución del sistema de ecuaciones diferenciales lineales $(D - A \cdot)(X) = G$ es:

$$X = X_0 + e^{At} \cdot C$$

siendo X_0 una solución particular y $C \in M^{1 \times n}(\mathbb{C})$ una matriz de constantes.